



ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
ДЕНТОКИНД А
(DENTOKIND® А)

Савдо номи
ДЕНТОКИНД А (DENTOKIND® А)

Дори шакли
Таблеткалар

Халқаро патентланмаган номи: йўқ

Таркиби
1 таблетка (100 мг) қуйидагиларни сақлайди:
таъсир этувчи моддалар: 15 мг Belladonna trit. D6, 15 мг Chamomilla trit. D6, 15 мг Ferrum phosphoricum trit. D6, 15 мг Hepar sulfuris trit. D12, 15 мг Pulsatilla trit. D6;
ёрдамчи моддалар: микрокристалл целлюлоза, лактоза моногидрати, магний стеарати, тальк.

Таърифи
Оқ ёки деярли оқ, ясси цилиндрик шаклли, фаскали таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи
Гомеопатик дори воситаси.

Фармакологик хусусиятлари
Гомеопатик даволаш касалликни тушуниш маъносида ва дори воситаларини қўлланишида анъанавий тиббиётдан аҳамиятли фарқ қилади. Гомеопатик воситалар организмнинг шахсий ҳимоя механизмларини рағбарлантиради ва шу тарзда ўзини-ўзи тиклаш қобилиятини фаоллаштиради. Гомеопатик воситаларга организмнинг реакцияси жуда шахсий. Шу сабабларга кўра доза-специфик фармакологик самаралар, фармакодинамик ёки фармакокинетик маълумотларни аниқлашнинг имконияти йўқ.

Қўлланилиши
Чакалоқлар ва болаларда тишларни чиқишида юзага келадиган таъсирчанлик, кўзғалувчанлик, кулоқларда оғрик, милқларда оғрик, енгил иситма ва ич кетиши каби симптомларда қўлланади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
Таъсир этувчи моддаларнинг бирортасига ёки препаратнинг ҳар қандай компонентларига юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Махсус кўрсатмалар ва эҳтиёткорлик чоралари
Препаратни овқат билан биргаликда қабул қилиш тавсия этилмайди. Энг яхшиси таблеткани овқатдан ярим соат олдин ёки ярим соат кейин қабул қилиш керак.
Агар Сизнинг шифокорингиз фарзандингизни айрим қандларни ўзлаштираолмаслиги хақида огохлантирган бўлса, препаратни қабул қилишни бошлашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашинг.

Дори воситаси лактоза сақлайди. Галактозани ўзлаштираолмасликнинг кам наслий муаммолари, Лапна лактаза танқислиги ёки глюкоза-галактозани кам сўрилиши каби бўлган пациентлар ушбу дори воситасини қабул қилишлари мумкин эмас.

Шифокор билан маслаҳатлашинг:

- агар фарзандингиз препаратга ёмон реакция қилса;
- агар қўшимча шикоятлар пайдо бўлса.

Ҳомиладорлик вақтида ва эмизиш даврида қўлланилиши

Препарат болалар учун мўлжалланган.

Транспорт воситалари ёки бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат болалар учун мўлжалланган.

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири кузатилмаган. Ушбу гомеопатик дори воситасини қўллаш бошқа дори воситаларини қабул қилишни чекламайди.

Агар ота-оналарнинг фарзандлари бошқа ҳар қандай дори воситаларини қабул қилаётган бўлса, яқинда қабул қилган бўлса ёки қабул қилиши мумкин бўлса, уларга шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Дозалаш тартиби ва қўллаш усули

Доимо ушбу тиббиётда қўлланишига доир йўриқномага ёки ўзингизни шифокорингиз ёки фармацевтнинг кўрсатмаларига риоя қилинг. Агар сиз препаратни тўғри қабул қилаётганингизга ишонч ҳосил қилмасангиз ўзингизни шифокорингиз ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг.

Дозалаш тартиби:

1 ёшгача бўлган болалар:

Касалликнинг ўткир симптомларида 1 таблеткадан ҳар соатда, кунига максимум 6 таблеткагача.

Симптомлар сусайганда 1 таблеткадан кунига 3 марта.

1 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар:

Касалликнинг ўткир симптомларида 2 таблеткадан ҳар соатда, кунига максимум 12 таблеткагача.

Симптомлар сусайганда 1 таблеткадан кунига 3 марта.

Қўллаш усули

Таблеткаларни оғизда аста-секин сўриш лозим. Кичик болалар учун таблеткаларни кўп бўлмаган микдордаги сув билан эритиш мумкин.

Таблеткани овқатдан ярим соат олдин ёки ярим соат кейин қабул қилиш керак.

Препаратнинг ўтказиб юборилган қабулини ўрнини тўлдириш учун болага препаратни икки марталик дозасини берманг.

Дозани ошириб юборилиши ҳолатида ҳеч қандай салбий оқибатлар кутилмайди.

Препаратни қабул қилишни тўхтатиши ҳолатида ҳеч қандай салбий оқибатлар кутилмайди.

Ножўя реакциялари

Барча дори воситалари каби, препарат ножўя реакциялар чақиритиши мумкин, бироқ улар ҳар бир инсонда ривожланмайди.

Ножўя самаралари номаълум.

Агар Сиз фарзандингизда қандайдир ножўя самаралар пайдо бўлди деб ҳисобласангиз, шифокор ёки фармацевт билан суҳбатлашинг. Бу ушбу тиббиётда қўлланишига доир йўриқномада кўрсатилмаган ҳар қандай ножўя самараларни ўз ичига олади.

Эслатма: гомеопатик препаратларни қабул қилиш вақтида мавжуд бўлган шикоятлар вақтинчалик ёмонлашиши мумкин (бошланғич гомеопатик зўриқиш). Бундай ҳолларда пациентларга препаратни қабул қилишни тўхтатиш ва шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Дозани ошириб юборилиши

Аниқланмаган.

Ўрама

150 таблеткалар флаконларда, 1 флакон тиббиётда қўлланишига доир йўриқнома билан бирга ўрамда.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда, болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

5 йил.

Ўрамада кўрсатилган яроқлилик муддати тугаганидан сўнг қўлланмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномасининг эгаси

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Ўзбекистон Республикаси ҳудудда дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва маъзили

“France Pharma” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси, 100041, Тошкент ш., М.Улугбек тумани, Навнихол кўч. 86
Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com